

Baldriantinktur hat in unserem Hause, Hofmann & Sommer, einen Namen bekommen: Melival®. Mit Melival® haben Sie ein rein pflanzliches Präparat aus dem Thüringer Land erworben. Die beruhigende, entspannende und somit krampflösende Wirkung des Baldrians, gepaart mit seiner schlaffördernden Eigenschaft, gehört zu den ältesten Erfahrungen der Menschen im Umgang mit Heilmitteln aus der Natur. Die Baldriantinktur Melival® ermöglicht Ihnen eine sanfte, schonende und zugleich erfolgreiche Selbstmedikation Ihrer Beschwerden. Die Firma Hofmann & Sommer hat sich in besonderer Weise der Herstellung von traditionell angewandten Heilmitteln verschrieben und wünscht Ihnen auf diesem Wege gute Besserung.

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Baldriantinktur Melival®

Wirkstoff: Baldriantinktur

Zusammensetzung

100 ml enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 ml Baldriantinktur DAB; Tinktur aus Baldrianwurzel (1:5 (Verhältnis Droge zu Auszugsmittel)) Auszugsmittel: Ethanol 70 % (V/V).

Darreichungsform und Inhalt

Flüssigkeit zum Einnehmen, Tropfflaschen mit 50 ml und 100 ml Inhalt, zusätzlich mit einem Meßbecher.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung.

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG
Chemisch-pharmazeutische Fabrik
Lindenstraße 11, 07426 Königsee
Telefon: 03 67 38 / 65 9-0, Telefax: 03 67 38 / 65 9-18

Anwendungsgebiete

Unruhezustände; nervös bedingte Einschlafstörungen.

Hinweis:

Wenn die nervös bedingten Einschlafstörungen oder die Unruhezustände länger andauern, sollte wie bei allen unklaren Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Baldriantinktur Melival® ist von Alkoholkranken nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes soll Baldriantinktur Melival® von Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahme für die Anwendung

Zur Anwendung von Baldriantinktur Melival® in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Baldriantinktur Melival® soll daher von diesem Personenkreis nicht angewendet werden.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln

Siehe Warnhinweise

Warnhinweis

Dieses Arzneimittel enthält 66,3 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme von max. 5 ml (= 1 Teelöffel) bis zu 2,7 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene zur Beruhigung 2 bis 3 mal täglich 2,5 ml (= 1/2 Teelöffel) und bei Schlafstörungen eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen 5 ml (= 1 Teelöffel) voll Baldriantinktur Melival®, verdünnt mit einem halben Glas Wasser, ein. Kinder ab 12 Jahre nehmen die Hälfte ein.

Die Dosierung erfolgt durch Tropfen in den beigefügten Meßbecher.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Wenn Sie eine Einzelgabe von Baldriantinktur Melival® versehentlich doppelt einnehmen, hat dies keine Auswirkungen, beachten Sie jedoch, dass Alkohol Ihre Fahrtauglichkeit verschlechtert.

Hinweis für den Fall der Überdosierung

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr. Weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden bei der 50 ml-Flasche etwa 25 g Alkohol und bei der 100 ml-Flasche etwa 59 g Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen

Bei Einnahme von Baldriantinktur Melival® kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen soweit verändert werden, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Vor Feuer schützen!

Gut verschlossen aufbewahren.

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der Faltschachtel angegeben. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information:

April 2005

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!