

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Uro Albin[®],

50 ml Mischung zum Einnehmen

Wirkstoffe: Solidago virgaurea Urtinktur, Colchicum Dil. D2, Nasturtium aquaticum Dil. D1

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Uro Albin[®] jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Uro Albin[®] und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Uro Albin[®] beachten?
3. Wie ist Uro Albin[®] einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Uro Albin[®] aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST URO ALBIN[®] UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Uro Albin[®] ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung der Harnorgane.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Reizzustände der ableitenden Harnwege.

Hinweis:

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Uro ALBIN[®] BEACHTEN?

Uro Albin[®] darf nicht eingenommen werden:

- Von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Colchicin, Nasturtium aquaticum (Brunnenkresse) und Solidago virgaurea (Goldrute).
- Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit darf Uro Albin[®] nicht angewendet werden. Während einer Therapie mit diesem Arzneimittel ist für sichere Empfängnisverhütung beider Geschlechter zu sorgen. Diese Empfängnisverhütung sollte von Männern noch 3 Monate nach Beendigung der Behandlung mit Uro Albin[®] betrieben werden. Frauen sollten bis zur folgenden Periode sicher verhüten.“
- Von Alkoholkranken
- Wegen des hohen Alkoholgehaltes soll Uro Albin[®] bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
- .

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Uro Albin[®] ist erforderlich:

- Dieses Arzneimittel enthält 61 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 1,6 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,4 g Alkohol zugeführt.
- Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.
- Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Bei Einnahme von Uro Albin[®] mit anderen Arzneimitteln

In der homöopathischen Literatur wird beschrieben, dass durch die vorangehende Gabe von Acidum aceticum eine Beeinträchtigung der therapeutischen Wirkung von Colchicum autumnale auftreten kann.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Uro Albin[®] zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Uro Albin[®] darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

3. WIE IST URO ALBIN[®] EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Uro Albin[®] immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet gilt für Erwachsene:

Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich je 5 Tropfen ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie sollten Sie Uro Albin[®] einnehmen?

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten die Tropfen unverdünnt etwa eine Minute im Mund belassen werden. Man kann sie auch auf ein Stück Zucker oder Brot einnehmen, oder mit einem Schluck Wasser, den man möglichst lange im Mund behält.

Wie lange sollten Sie Uro Albin einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Uro Albin® eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Inhaltes einer 50 ml Flasche werden etwa 25 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz, Hautausschlag, Schwellung der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum sowie im Magen-Darm-Beschwerden, Schmerzen, Krämpfe und Übelkeit auftreten.

H i n w e i s:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Arzneimittel
und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53185 Bonn
Deutschland
Fax: 0049 228 207-5207
Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST URO ALBIN[®] AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Etikett der Flasche aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Uro Albin[®] enthält:

10 ml enthalten:

Wirkstoffe:

Solidago virgaurea Urtinktur 9,8 ml

Colchicum Dil. D2 0,1 ml

Nasturtium aquaticum_Dil. D1 0,1 ml.

1 ml entspricht 30 Tropfen

Wie Uro Albin[®] aussieht und Inhalt der Packung

Uro Albin[®] ist eine grünlich-braune, klare Lösung in einer Glasflasche mit Tropfeinsatz.

Packungsgröße: 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Homviora Arzneimittel

Dr. Hagedorn GmbH & Co.

Arabellastraße 5

81925 München

Tel. 0049 (0) 89 921 994 30

info@homviora.de

Hersteller:

Synthera

Dr. Friedrichs GmbH & Co. KG

Dammstraße 7

59821 Arnsberg

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 07/2014