



Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage (Gebrauchsinformation) sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dolormin extra jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

- 1 Was ist Dolormin extra und wogegen wird es eingenommen?
- 2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Dolormin extra beachten?
- 3 Wie ist Dolormin extra einzunehmen?
- 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5 Wie ist Dolormin extra aufzubewahren?

Dolormin[®] extra

Wirkstoff:

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Ibuprofen (vorliegend als Ibuprofen DL-Lysinsalz).

1 Filmtablette enthält 400 mg Ibuprofen (entsprechend 684 mg Ibuprofen, DL-Lysinsalz).

Die sonstigen Bestandteile sind: Povidon, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Hypromellose, Hyprolose, Titandioxid (E 171).

Dolormin extra ist in Packungen mit 10, 20, 30 und 50 Filmtabletten erhältlich.

1 Was ist Dolormin[®] extra und wogegen wird es eingenommen?

Dolormin extra ist ein schmerzstillendes, entzündungshemmendes und fiebersenkendes Arzneimittel (nicht-steroidales Antiphlogistikum / Analgetikum).

von:

McNeil GmbH & Co. oHG
Postfach 210411, 41430 Neuss
Tel.: 01803 / 48 11 11

(0,09€/Min aus dem deutschen Festnetz;
abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Dolormin extra wird eingenommen bei:

- Leichten bis mäßig starken Schmerzen – wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen
- Fieber

hergestellt von:

Janssen-Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
I-04010 Borgo S. Michele (LT)

2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Dolormin[®] extra beachten?

Dolormin extra darf nicht eingenommen werden.


- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Ibuprofen oder einem der sonstigen Bestandteile von Dolormin extra sind.
- wenn Sie in der Vergangenheit mit Asthmaanfällen, Nasenschleimhautschwellungen oder Hautreaktionen nach der Einnahme von Acetylsalicylsäure oder anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern reagiert haben.
- bei bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmgeschwüren oder bei Magen- oder Darmblutungen.
- wenn Sie unter schweren Leber- oder Nierenfunktionsstörungen oder unter schweren, unkontrollierten Herzbeschwerden leiden.
- in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft.

Kinder

- von Kindern unter 6 Jahren, da die Einzeldosis zu hoch ist. Für diese Altersgruppe stehen andere Darreichungsformen zur Verfügung.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dolormin extra ist erforderlich bei

- einer angeborenen Blutbildungsstörung (akuter intermittierender Porphyrie).
- bestimmten Erkrankungen des Immunsystems (systemischer Lupus erythematoses oder Mischkollagenosen).



- Magen-Darm-Beschwerden oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (Colit ulcerosa, Morbus Crohn).
- eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion.
- Bluthochdruck oder Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz).
- Allergien (z. B. Hautreaktionen auf andere Mittel, Asthma, Heuschnupfen), chronischen Schleimhautschwellungen oder chronischen, die Atemwege verengenden Atemwegserkrankungen. Ihr Risiko für Überempfindlichkeitsreaktionen ist dann erhöht.

Sprechen Sie in allen diesen Fällen mit Ihrem Arzt.

Schwangerschaft

Wird während einer längeren Einnahme von Dolormin extra eine Schwangerschaft festgestellt, so ist der Arzt zu benachrichtigen.

Im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel sollte Dolormin extra nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

In den letzten drei Monaten der Schwangerschaft darf Dolormin extra wegen eines erhöhten Risikos von Komplikationen für Mutter und Kind nicht eingenommen werden.

Stillzeit

Der Wirkstoff Ibuprofen und seine Abbauprodukte gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Da nachteilige Folgen für den Säugling bisher nicht bekannt geworden sind, wird bei kurzfristiger Einnahme der empfohlenen Dosis bei leichten bis mäßig starken Schmerzen oder Fieber eine Unterbrechung des Stillens nicht erforderlich sein.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen


Bei kurzfristiger Einnahme der für Dolormin extra empfohlenen Dosen ist keine Beeinträchtigung zu erwarten.

Worauf müssen Sie noch achten?

Nebenwirkungen sind am geringsten, wenn stets die kleinste wirksame Menge des Medikaments für die kürzest notwendige Zeit eingenommen wird.

Bei längerem hochdosierten, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch von Schmerzmitteln können Kopfschmerzen auftreten, die nicht durch erhöhte Dosen des Arzneimittels behandelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheitsmäßige Einnahme von Schmerzmitteln, ins-





Dolormin® extra und s eingenommen?

schmerzstillendes, entzündungshemmendes und fiebersenkendes
lokales Antiphlogistikum / Analgetikum).

hergestellt von:

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo S. Michele (LT)

schichten Festnetz;
Anreise möglich)

erzogen bei:

erhöhten Schmerzen – wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-

Wichtig vor der Einnahme von Dolormin® extra

Wichtig eingenommen werden,

1 (allergisch) gegenüber Ibuprofen oder einem der sonstigen
n extra sind.

nheit mit Asthmaanfällen, Nasenschleimhautschwellungen
1 der Einnahme von Acetylsalicylsäure oder anderen nicht-
entzündungshemmern reagiert haben.

1 der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder
1 der Magen- oder Darmblutungen.

1 der Leber- oder Nierenfunktionsstörungen oder unter schweren,
1 der werden leiden.

1 der Einnahme der Schwangerschaft.

1, da die Einzeldosis zu hoch ist. Für diese Altersgruppe
1 der zur Verfügung.

1 der Einnahme von Dolormin extra ist erforderlich bei
1 der Leistungsstörung (akuter intermittierender Porphyrie).
1 der des Immunsystems (systemischer Lupus erythematosus)

- Magen-Darm-Beschwerden oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn).
- eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion.
- Bluthochdruck oder Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz).
- Allergien (z. B. Hautreaktionen auf andere Mittel, Asthma, Heuschnupfen), chronischen Schleimhautschwellungen oder chronischen, die Atemwege verengenden Atemwegserkrankungen. Ihr Risiko für Überempfindlichkeitsreaktionen ist dann erhöht.

Sprechen Sie in allen diesen Fällen mit Ihrem Arzt.

Schwangerschaft

Wird während einer längeren Einnahme von Dolormin extra eine Schwangerschaft festgestellt, so ist der Arzt zu benachrichtigen.

Im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel sollte Dolormin extra nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

In den letzten drei Monaten der Schwangerschaft darf Dolormin extra wegen eines erhöhten Risikos von Komplikationen für Mutter und Kind nicht eingenommen werden.

Stillzeit

Der Wirkstoff Ibuprofen und seine Abbauprodukte gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Da nachteilige Folgen für den Säugling bisher nicht bekannt geworden sind, wird bei kurzfristiger Einnahme der empfohlenen Dosis bei leichten bis mäßig starken Schmerzen oder Fieber eine Unterbrechung des Stillens nicht erforderlich sein.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bei kurzfristiger Einnahme der für Dolormin extra empfohlenen Dosen ist keine Beeinträchtigung zu erwarten.

Worauf müssen Sie noch achten?

Nebenwirkungen sind am geringsten, wenn stets die kleinste wirksame Menge des Medikaments für die kürzest notwendige Zeit eingenommen wird.

Bei längerem hochdosierten, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch von Schmerzmitteln können Kopfschmerzen auftreten, die nicht durch erhöhte Dosen des Arzneimittels behandelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheitsmäßige Einnahme von Schmerzmitteln, insbe-

sondere bei Kombination mehrerer schmerzstillender Wirkstoffe, zur dauerhaften Nierenschädigung mit dem Risiko eines Nierenversagens (Analgetika-Nephropathie) führen.

Einnahme von Dolormin extra zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Während der Einnahme von Dolormin extra sollten Sie möglichst keinen Alkohol trinken.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparategruppen kann bei gleichzeitiger Behandlung mit Dolormin extra beeinflusst werden.

Verstärkung der Wirkung bis hin zu erhöhtem Nebenwirkungsrisiko:


- Lithium (Mittel zur Behandlung geistig-seelischer Erkrankungen): Lassen Sie den Lithiumspiegel zur Sicherheit kontrollieren.
- Blutgerinnungshemmende Mittel: Lassen Sie die Blutgerinnung kontrollieren.
- Methotrexat (Mittel zur Behandlung von Krebserkrankungen bzw. von bestimmten rheumatischen Erkrankungen): Nebenwirkungen sind verstärkt.
- Glukokortikoide (Arzneimittel, die Kortison oder kortisonähnliche Stoffe enthalten), Acetylsalicylsäure oder andere nicht-steroidale Antiphlogistika / Analgetika (entzündungs- und schmerzhemmende Mittel): Risiko für Magen-Darm-Geschwüre und Magen-Darm-Blutungen erhöht, außer wenn die Wirkstoffe nur auf der Haut aufgetragen werden.

Abschwächung der Wirkung:


- Entwässernde (Diuretika) und blutdrucksenkende (Antihypertonika) Arzneimittel.

Sonstige mögliche Wechselwirkungen:

- Zidovudin: Erhöhtes Risiko für Gelenk- und Blutergerüsse bei HIV positiven Blutern.



Bitte wenden!



erwünschten Wirkungen umfasst alle bekanntgewor-
r Behandlung mit Ibuprofen, auch solche unter hoch-
eumapatienten. Die Häufigkeitsangaben, die über
:hen, beziehen sich auf die kurzzeitige Anwendung
200 mg Ibuprofen (= 3 Filmtabletten Dolormin extra).
kungen werden folgende Häufigkeitsangaben

10 Behandelten
von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

odbrennen, Bauchschmerzen, Übelkeit.

und Erbrechen.

mständen mit Blutung und Durchbruch. Sollten
i, Bluterbrechen, Blut im Stuhl oder eine Schwarz-
üssen Sie Dolormin extra absetzen und sofort

ig und Ansammlung von Wasser im Körper (Ödeme).

Diese Zeichen können Ausdruck einer Nierenerkrankung bis hin zum Nierenversagen
sein. Sollten die genannten Symptome auftreten oder sich verschlimmern, müssen
Sie Dolormin extra absetzen und sofort Kontakt mit Ihrem Arzt aufnehmen.
- Nierengewebsschädigung (Papillennekrosen), insbesondere bei Langzeittherapie.
- Erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut.

Leber:

Sehr selten:

- Leberschäden, insbesondere bei Langzeittherapie.

Blut:

Sehr selten:

- Störungen der Blutbildung. Erste Anzeichen können sein: Fieber, Halsschmerzen,
oberflächliche Wunden im Mund, grippeartige Beschwerden, starke
Abgeschlagenheit, Nasenbluten und Hautblutungen. In diesen Fällen ist das
Arzneimittel sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen. Jegliche Selbstbehandlung
mit schmerz- oder fiebersenkenden Arzneimitteln sollte unterbleiben.

Haut:

Sehr selten:

- Schwere Hautreaktionen wie Hautausschlag mit Rötung und Blasenbildung
(z. B. Erythema exsudativum multiforme).

Immunsystem:

Sehr selten:

- Anzeichen einer Hirnhautentzündung (aseptische Meningitis) wie starke Kopf-
schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Nackensteifigkeit oder Bewusstseinstörung.
Ein erhöhtes Risiko scheint für Patienten zu bestehen, die bereits an bestimmten
Erkrankungen des Immunsystems (systemischer Lupus erythematodes oder Misch-
kollagenosen) leiden.

Überempfindlichkeitsreaktionen:

Gelegentlich:

- Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlägen und Hautjucken sowie
Asthmaanfällen (eventuell mit Blutdruckabfall).

Sehr selten:

- Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen. Anzeichen hierfür können sein:
Schwellungen von Gesicht, Zunge und Kehlkopf mit Einengung der Luftwege,
Atemnot, Herzjagen, Blutdruckabfall bis hin zum lebensbedrohlichen Schock.

Bei Auftreten einer dieser Erscheinungen, die schon bei Erstanwendung vor-
kommen können, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen
bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5 Wie ist Dolormin® extra aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton / Behältnis angege-
benen Verfalldatum nicht mehr verwenden.


Stand der Information:

März 2004

Zusätzliche Informationen:

**Von Dolormin® werden folgende Arzneimittel zur Behandlung
von leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber angeboten:**

- Dolormin Schmerztabletten, 200 mg Ibuprofen als DL-Lysinsalz (ab 6 Jahre)
- Dolormin extra (Filmtabletten), 400 mg Ibuprofen als DL-Lysinsalz
(ab 6 Jahre)
- Dolormin instant schnell lösliches Granulat, 200 mg Ibuprofen
als DL-Lysinsalz (ab 6 Jahre)
- Dolormin für Kinder Ibuprofensaft 2%
(ab 6 Monate), bzw. 4% (ab 3 Jahre)



DE - 966953

3 Wie ist Dolormin® extra einzunehmen?

Nehmen Sie Dolormin extra immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter (bzw. Körpergewicht)	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene	1/2–1 Filmtablette (entsprechend 200–400 mg Ibuprofen)	bis zu 3 Filmtabletten (entsprechend bis 1200 mg Ibuprofen)
Jugendliche 13–14 Jahre (ca. 44–52 kg)	1/2–1 Filmtablette (entsprechend 200–400 mg Ibuprofen)	1 1/2–2 1/2 Filmtabletten (entsprechend 600–1000 mg Ibuprofen)
Kinder 10–12 Jahre (ca. 30–43 kg)	1/2 Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	1 1/2–2 Filmtabletten (entsprechend 600–800 mg Ibuprofen)
Kinder 6–9 Jahre (ca. 20–29 kg)	1/2 Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	bis zu 1 1/2 Filmtabletten (entsprechend bis 600 mg Ibuprofen)

Wenn Sie die maximale Einzeldosis eingenommen haben, warten Sie mindestens 4 Stunden bis zur nächsten Einnahme.

Nehmen Sie Dolormin extra unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise 1 Glas Wasser) ein. Dies fördert den Wirkeintritt. Die Filmtabletten können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Für Patienten, die einen empfindlichen Magen haben, empfiehlt es sich, Dolormin extra während der Mahlzeiten einzunehmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Dolormin extra zu stark oder zu schwach ist. Nehmen Sie Dolormin extra ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht länger als 4 Tage ein.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Dolormin extra Nebenwirkungen haben.

Die Aufzählung der folgenden unerwünschten Wirkungen umfasst alle bekanntgewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Ibuprofen, auch solche unter hochdosierter Langzeittherapie bei Rheumapatienten. Die Häufigkeitsangaben, die über sehr seltene Meldungen hinausgehen, beziehen sich auf die kurzzeitige Anwendung bis zu Tagesdosen von maximal 1200 mg Ibuprofen (= 3 Filmtabletten Dolormin extra). Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Verdauungstrakt:

Gelegentlich:

- Magen-Darm-Beschwerden wie Sodbrennen, Bauchschmerzen, Übelkeit.

Selten:

- Blähungen, Durchfall, Verstopfung und Erbrechen.

Sehr selten:

- Magen-Darm-Geschwüre, unter Umständen mit Blutung und Durchbruch. Sollten stärkere Schmerzen im Oberbauch, Bluterbrechen, Blut im Stuhl oder eine Schwarzfärbung des Stuhls auftreten, so müssen Sie Dolormin extra absetzen und sofort Ihren Arzt informieren.

Nervensystem:

Gelegentlich:

- Kopfschmerzen.

Niere:

Sehr selten:

- Verminderung der Harnausscheidung und Ansammlung von Wasser im Körper (Ödeme).

Diese Zeichen können Ausdruck einer Nierenerkrankung bis hin zum Nierenversagen sein. Sollten die genannten Symptome auftreten oder sich verschlimmern, sollten Sie Dolormin extra absetzen und sofort Kontakt mit Ihrem Arzt aufnehmen.
- Nierengewebsschädigung (Papillennekrosen), insbesondere bei Langzeittherapie.
- Erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut.

Leber:

Sehr selten:

- Leberschäden, insbesondere bei Langzeittherapie.

Blut:

Sehr selten:

- Störungen der Blutbildung. Erste Anzeichen können sein: Fieber, Hals- und Kopfschmerzen, oberflächliche Wunden im Mund, grippeartige Beschwerden, starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten und Hautblutungen. In diesen Fällen sollten Sie Ihr Arzneimittel sofort absetzen und einen Arzt aufsuchen. Jegliche Symptome sollten mit schmerz- oder fiebersenkenden Arzneimitteln nicht unterdrückt werden.

Haut:

Sehr selten:

- Schwere Hautreaktionen wie Hautausschlag mit Rötung und Blasenbildung (z. B. Erythema exsudativum multiforme).

Immunsystem:

Sehr selten:

- Anzeichen einer Hirnhautentzündung (aseptische Meningitis) wie starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Nackensteifigkeit oder Bewusstseinsstörungen. Ein erhöhtes Risiko scheint für Patienten zu bestehen, die bereits an bakteriellen Erkrankungen des Immunsystems (systemischer Lupus erythematodes oder Sarkoidose) leiden.

Überempfindlichkeitsreaktionen:

Gelegentlich:

- Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlägen und Hautjuckreiz (z. B. Asthmaanfällen (eventuell mit Blutdruckabfall)).

Sehr selten:

- Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen. Anzeichen hierfür können sein: Schwellungen von Gesicht, Zunge und Kehlkopf mit Einengung der Luftwege, Atemnot, Herzjagen, Blutdruckabfall bis hin zum lebensbedrohlichen Anaphylaxie.