

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Simethicon-ratiopharm® Kautabletten

Kautabletten zum Einnehmen

Wirkstoff: Dimeticon-1000-Siliciumdioxid (94,5 : 5,5)
(syn.: Simethicon)

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Kautablette enthält 85 mg Dimeticon-1000-Siliciumdioxid (94,5 : 5,5).

Sonstige Bestandteile:

Cellulosepulver, Lactose, Sorbitol, Calciumhydrogenphosphat, Talcum, Saccharin-Natrium, Aromastoffe, Siliciumdioxid.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 20 Kautabletten (N1)

Originalpackung mit 50 Kautabletten (N2)

Originalpackung mit 100 Kautabletten (N3)

Stoff- oder Indikationsgruppe

Entschäumer

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm
Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30

Hersteller:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren
Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20

Anwendungsgebiete

- Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl.
- Zur Vorbereitung von Untersuchungen im Bauchbereich, wie z. B. Röntgen und Sonographie.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Simethicon-ratiopharm® Kautabletten nicht anwenden?

Simethicon-ratiopharm® Kautabletten dürfen nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels besteht.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Simethicon-ratiopharm® Kautabletten während der Schwangerschaft und der Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Simethicon-ratiopharm® Kautabletten oder werden selbst durch Simethicon-ratiopharm® Kautabletten in ihrer Wirkung beeinflusst? Was müssen Sie gegebenenfalls beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel anwenden?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Simethicon-ratiopharm® Kautabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Simethicon-ratiopharm® Kautabletten sonst nicht richtig wirken können.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Simethicon-ratiopharm® Kautabletten einnehmen?

Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:

Erwachsene und Jugendliche:

Sofern vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Sie 3 – 4-mal täglich 1 – 2 Kautabletten ein.

Kinder im Alter von 6 – 14 Jahren:

Sofern vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Kinder 3 – 4-mal täglich 1 Kautablette.

Für jüngere Kinder und Säuglinge stehen andere Darreichungsformen zur Verfügung.

Zur Vorbereitung für bildgebende Untersuchungen:

Nach Anweisung des Arztes.

Falls nicht anders verordnet: 3 – 4 Kautabletten am Tag vor der Untersuchung und 1 Kautablette am Morgen des Untersuchungstages einnehmen.

Wie und wann sollten Sie Simethicon-ratiopharm® Kautabletten einnehmen?

Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:

Simethicon-ratiopharm® Kautabletten werden nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen eingenommen.

Zur Art der Anwendung im Rahmen der Sonographie/Röntgendiagnostik siehe oben.

Die Kautabletten sollten gut zerkaut eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Simethicon-ratiopharm® Kautabletten einnehmen?

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Simethicon-ratiopharm[©] Kautabletten können, falls erforderlich, auch über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis:

Bei neu aufgetretenen und länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u. U. zugrunde liegende behandlungsbedürftige Erkrankung diagnostiziert werden kann.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Simethicon-ratiopharm® Kautabletten in zu großen Mengen eingenommen wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Der Wirkstoff von Simethicon-ratiopharm® Kautabletten bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Deshalb ist eine Vergiftung praktisch ausgeschlossen. Auch größere Mengen Simethicon-ratiopharm® Kautabletten werden problemlos vertragen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Simethicon-ratiopharm® Kautabletten angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Führen Sie die Einnahme wie unter »Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung« beschrieben fort.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

In diesem Falle kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Simethicon-ratiopharm® Kautabletten auftreten, und welche Gegenmaßnahmen sind gegebenenfalls zu ergreifen?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Simethicon-ratiopharm[©] Kautabletten wurden bisher nicht beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und den Durchdrückpackungen aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind Simethicon-ratiopharm[©] Kautabletten aufzubewahren?

Die Kautabletten stets in der Originalverpackung (Blister) aufbewahren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen!

Stand der Information

Juni 2000

Achten Sie stets darauf, Simethicon-ratiopharm® Kautabletten so aufzubewahren, dass dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist!

Versionscode: Z02