

## **Liebe Patientin, lieber Patient !**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Gebrauchsinformation**

# **CONVA-CYL®**

## **HO-LEN-COMPLEX®**

### **Zusammensetzung:**

10 g (entsprechend 10,8 ml) Mischung enthalten:

#### **Arzneilich wirksame Bestandteile:**

Cactus	Dil. D2	1,25 g
Camphora	Dil. D3	1,00 g
China	Dil. D2	0,50 g
Convallaria	Dil. D4	1,00 g
Crataegus	Ø	2,00 g
Digitalis	Dil. D6	1,25 g
Ferrum metallicum	Dil. D8	0,50 g
Kalium carbonicum	Dil. D3	1,25 g
Strophanthus	Dil. D4	1,25 g

1ml entspricht 21 Tropfen.

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackung mit 30 ml, 50 ml, 100 ml Mischung.

### **Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**Pharma Liebermann GmbH**

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073) 9 58 93-0

Telefax: (09073) 9 58 93-55

### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### **Gegenanzeigen:**

**Wann dürfen Sie Conva-cyl® Ho-Len-Complex® nicht anwenden?**

Nicht anwenden bei Chininüberempfindlichkeit sowie bei Alkoholkranken.

**Wann dürfen Sie Conva-cyl® Ho-Len-Complex® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?**

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Conva-cyl® Ho-Len-Complex® nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen. Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

**Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten

Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### **Warnhinweis:**

Conva-cyl® Ho-Len-Complex® enthält 53 Vol.% Alkohol !

#### **Wechselwirkungen**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

#### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Conva-cyl® Ho-Len-Complex® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Conva-cyl® Ho-Len-Complex® nicht richtig wirken kann !

#### **Wieviel und wie oft sollten Sie Conva-cyl® Ho-Len-Complex® anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

#### **Wie und wann sollten Sie Conva-cyl® Ho-Len-Complex® anwenden?**

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

#### **Wie lange sollten Sie Conva-cyl® Ho-Len-Complex® anwenden?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Nebenwirkungen**

#### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Conva-cyl® Ho-Len-Complex® auftreten?**

In seltenen Fällen können nach Einnahme von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Hinweis:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum !

**Stand der Information:** Februar 2006

**Reg.-Nr.** 2522771.00.00