



RHEUMA-PASC® Liquidum SL

Zusammensetzung: 10 g (= 10,8 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Ø 0,5 g, Colchicum Dil. D1 0,01 g, Berberis Ø 0,5 g, Rhus toxicodendron Dil. D3 0,05 g, Thuja Dil. D1 0,025 g, Ledum Dil. D2 0,5 g, Dulcamara Dil. D3 0,085 g, Ulmus campestris (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 3a) 0,085 g, Natrium nitricum Dil. D3 0,085 g, China Dil. D3 0,085 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 86% (m/m), Likörwein.

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackungen mit 50 ml und 100 ml Mischung.

Stoff- oder Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers: PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl 35383 Giessen, Telefon (0641) 7960-0, Telefax (0641) 7960-109, E-Mail: info@pascoe.de.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Rheumatismus, Arthritis urica, Arthrosis deformans, Osteochondrose, Osteoporose, Myogelosen, Lumbalgie, Ischialgie, Neuralgie, vegetatives Reizsyndrom.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie RHEUMA-PASC® Liquidum SL nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse soll RHEUMA-PASC® Liquidum SL nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Während Schwangerschaft und Stillzeit sollte RHEUMA-PASC® Liquidum SL nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Enthält 61 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, Erwachsene bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen, bei chronischen Verlaufsformen 3-mal täglich 5 Tropfen in Wasser einnehmen. Kleinkinder von 1 bis 6 Jahren erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis (entsprechend akut: nicht mehr als 15 Tropfen, chronisch: nicht mehr als 8 Tropfen täglich), Kinder von 7 bis 12 Jahren erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis (entsprechend akut: nicht mehr als 20 Tropfen täglich, chronisch: nicht mehr als 10 Tropfen täglich). Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: Nicht begrenzt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweise: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.



PASCOE
NATURMEDIZIN

pharmazeutische Präparate GmbH · D-35383 Giessen

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise: Nach Ablauf des auf Flasche und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Datum der Fassung: 22.02.2006

Wirkungsweise: RHEUMA-PASC® Liquidum SL ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, dessen wirksame Komponenten nach ihren homöopathischen Arzneimittelbildern auf eine Umstimmung des Organismus bei Gicht und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises abgestimmt sind und die vielfältige Wirkungsrichtungen haben.

Nachfolgend werden die Bestandteile sowie deren Anwendungsgebiete aufgeführt:

Bryonia (Weiße Zaunrube)	Akuter und chronischer Rheumatismus
Colchicum (Herbstzeitlose)	Akute und chronische Gicht; akuter Gelenkrheumatismus
Berberis (Sauerdorn)	Gicht, Rheumatismus
Rhus toxicodendron (Giftsumach)	Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln
Thuja (Lebensbaum)	Rheumatismus
Ledum (Sumpfporst)	Gicht- und Gelenkrheumatismus.
Dulcamara (Bittersüß)	Entzündungen der Gelenke.
Ulmus campestris (Feldulme)	Rheumatische Schmerzen der Hand- und Fußgelenke
Natrium nitricum (Natriumnitrat)	Rheumatismus
China (Chinarinde)	Allgemeine Blutvergiftung, allgemeine Entkräftung, Nervenschmerzen.

Die Behandlung mit RHEUMA-PASC® Liquidum SL wird sinnvoll durch eine Diät ergänzt. Hauptmerkmale der Rheuma-Gicht-Diät sind: Weitgehende Reduktion der Fleischspeisen (auf keinen Fall innere Organe und kleinere Fische), Einschränkung des Alkoholgenusses, salzarme Kost, Gewichtsreduktion. Dem Körper soll immer ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden, um die mögliche Auskristallisation der ausgeschwemmten Harnsäure in den ableitenden Harnwegen zu vermeiden. Gut geeignet sind alkalisierende Mineralwässer oder Kräutertees, vorteilhaft ist eine laktovegetabile Kost (Milch, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Salate, Kartoffeln, Reis).



PASCOE
NATURMEDIZIN

pharmazeutische Präparate GmbH · D-35383 Giessen

11056-DE-001