

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Gebrauchsinformation



# Milax<sup>®</sup> 1,0

Wirkstoff: Glycerol

#### Zusammensetzung

1 Zäpfchen enthält:

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*

Glycerol 1,0 g

*Sonstige Bestandteile:*

Leichtes basisches Magnesiumcarbonat, Polysorbat 80, Hartfett

#### Darreichungsform und Inhalt

Milax<sup>®</sup> 1,0 ist in Packungen zu 10 Zäpfchen (N2) erhältlich.

#### Indikationsgruppe / Wirkungsweise

Abführmittel

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin

#### Anwendungsgebiete

Bei Verstopfung sowie zur Darmentleerung vor rektalen Untersuchungen (Rektoskopie, Untersuchung des Enddarmes); zur Erweichung des Stuhls bei Haemorrhoiden und Analfissuren (schmerzhafter Haut-, Schleimhauteinriss im Afterbereich).

#### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Milax<sup>®</sup> 1,0 nicht anwenden?*

Glycerol-Zäpfchen sind nicht anzuwenden bei Vorliegen von Darmverschluss (Ileus) und unklaren Bauchschmerzen.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Berichte über schädliche Wirkungen während der Schwangerschaft und der Stillperiode beim Menschen sind nicht bekannt.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

keine bekannt

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung


Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Milax<sup>®</sup> 1,0 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Milax<sup>®</sup> 1,0 sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel Milax® 1,0-Zäpfchen sollten Sie nehmen und wie oft?*

Soweit nicht anders verordnet, wird bei Bedarf 1–2mal täglich etwa 20 bis 30 Minuten vor der beabsichtigten Entleerung 1 Zäpfchen in den Darm eingeführt.

*Wie sollten Sie Milax® 1,0 anwenden?*

Zur Entnahme wird ein Zäpfchen nach mehrmaligem Knicken der Perforation vom Streifen abgerissen bzw. mit Hilfe einer Schere abgetrennt. Die an der Zäpfchenspitze befindlichen lose aneinanderliegenden Folienblättchen werden mit Daumen und Zeigefinger jeder Hand ergriffen und vorsichtig (bis das Zäpfchen aus der Folienhülle entnehmbar ist) auseinandergezogen (siehe Abbildung).



Das Zäpfchen wird am besten angefeuchtet und vorsichtig tief in den After eingeführt. Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit eventuell das Zäpfchen in der Hand erwärmen oder kurz in warmes Wasser tauchen.

*Wie lange sollten Sie Milax® 1,0 anwenden?*

Bei hartnäckiger Verstopfung oder anhaltenden Analbeschwerden entscheidet der behandelnde Arzt über die Dauer der Anwendung.

#### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Milax® 1,0 auftreten?*

Reizungen der Enddarmschleimhaut sind möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Zäpfchenfolie aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

*Wie ist Milax® 1,0 aufzubewahren?*

Vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25 °C aufbewahren.

#### **Stand der Information**

April 2001

**Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!**