



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 62 51) 10 97-0 · Fax (0 62 51) 33 42  
<http://www.reckeweg.de>

*Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.*

## GEBRAUCHSINFORMATION

### **Herpes-Gastreu® R 68** Homöopathisches Arzneimittel

#### **Zusammensetzung:**

10 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Croton tiglium Dil. D6 2 ml, Mezereum Dil. D4 5 ml, Natrium chloratum Dil. D6 1 ml, Rhus toxicodendron Dil. D4 2ml. Gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen mit Ethanol 30 Prozent (m/m) gemäß HAB, Vorschrift 40a.

Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

22 ml / 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

#### **Homöopathisches Arzneimittel bei Hauterkrankungen**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: 062 51 / 1097-0 · Fax: 062 51 / 3342  
<http://www.reckeweg.de>

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern der einzelnen Bestandteile. Dazu gehören: Krankhafte Hautveränderungen bei Windpocken oder Gürtelrose.

*Hinweis:* Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.

#### **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise**

##### Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

##### Schwangerschaft und Stillzeit:

Das Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:****Keine bekannt.**

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.  
Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

**Dosierungsanleitung:**

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen jeweils 5 Tropfen bis höchstens 6 mal täglich einnehmen.

Schulkinder ab 12 Jahre nehmen jeweils 3 statt 5 Tropfen.

Die Tropfen sollten 30 Minuten vor oder nach einer Mahlzeit in Wasser verdünnt eingenommen werden.

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels können sich die als Nebenwirkung bekannten Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwindelgefühl und Benommenheit verstärken. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

**Nebenwirkungen:**

Bei empfindlichen Personen kann es zu Reizungen im Mund, Rachen und Magen-Darm-Kanal kommen, die mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwindelgefühl und Benommenheit einhergehen können.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, so teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums soll das Arzneimittel nicht mehr angewendet werden.

**Aufbewahrung:**

Bei Raumtemperatur.

Stand der Information: Juli 2003

---

**Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6276765.00.00

**Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.**