



## Gebrauchsinformation

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist **Micotar® Lösung** und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Micotar® Lösung** beachten?
3. Wie ist **Micotar® Lösung** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Micotar® Lösung** aufzubewahren?

# Micotar® Lösung

Wirkstoff: Miconazol

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Miconazol.

1 ml Lösung enthält 20 mg Miconazol.

Die sonstigen Bestandteile sind 2-Propanol, Propylenglykol und Macrogol 400.

**Micotar® Lösung** ist in Packungen zu 10 ml und 20 ml Lösung erhältlich.

## 1. Was ist Micotar® Lösung und wofür wird sie angewendet?

**1.1 Micotar® Lösung** ist ein Antimykotikum.

### 1.2 von:

**Dermapharm AG**

Luise-Ullrich-Straße 6

82031 Grünwald

Tel.: 0 89/ 6 41 86-0

Fax: 0 89/ 6 41 86-1 30

### hergestellt von:

**mibe** GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

### 1.3 Micotar® Lösung wird angewendet bei:

Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere, wie *Malassezia furfur*. Diese können vorkommen z.B. in Form von

- Mykosen der Füße (Mykose der Zehenzwischenräume, Fußsohlen, Fußrücken)
- Mykosen bzw. Pilzbefall der Körperhaut und Körperhautfalten
- oberflächlichen Candidosen
- Pityriasis versicolor (Kleienpilzflechte)
- Erythrasma

## 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Micotar® Lösung beachten?

### 2.1 Micotar® Lösung darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile von **Micotar® Lösung** sind.

### 2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Micotar® Lösung ist erforderlich:

#### Schwangerschaft

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie können **Micotar® Lösung** bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Schwangerschaft anwenden.

#### Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie können **Micotar® Lösung** bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Stillzeit anwenden. Um den direkten Kontakt Ihres Säuglings mit **Micotar® Lösung** zu vermeiden, sollten Sie **Micotar® Lösung** während der gesamten Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparategruppen kann bei gleichzeitiger Behandlung mit **Micotar® Lösung** beeinflusst werden.

Bei Anwendung auf der Haut kann der Wirkstoff Miconazol unter Umständen die Aktivität oral eingenommener Blutgerinnungshemmer wie Warfarin verstärken.

### 3. Wie ist Micotar® Lösung anzuwenden?

Wenden Sie **Micotar® Lösung** immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### 3.1 Art der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

#### 3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

##### Dosierung:

Die Lösung wird 1 - 3mal täglich auf die erkrankte Hautregion aufgetragen.

##### Art und Dauer der Anwendung:

Lösung zum Auftragen auf die Haut.

Die Therapiedauer beträgt durchschnittlich 2 - 5 Wochen. Die Behandlung sollte bis zum Verschwinden der positiven Pilzkulturen durchgeführt werden, mindestens jedoch noch 14 Tage nach Abklingen der Beschwerden. Zwischen dem letzten Auftragen und dem Anlegen einer Pilzkultur sollte ein therapiefreies Intervall von 3 - 4 Tagen liegen, damit evtl. Wirkstoffreste die Kultur nicht stören.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Micotar® Lösung** zu stark oder zu schwach ist.

#### 3.3 Wenn Sie die Anwendung von Micotar® Lösung vergessen haben:

Fahren Sie bitte mit dem Behandlungsplan wie gewohnt fort. Eine einmalige Unterbrechung der Behandlung hat keine schädlichen Auswirkungen.

#### 3.4 Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Micotar® Lösung abgebrochen wird:

Sie gefährden damit den Behandlungserfolg. Deswegen sollten Sie die Behandlung mit **Micotar® Lösung** nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt unterbrechen oder vorzeitig abbrechen.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Micotar® Lösung** Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten	mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten	1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

#### 4.1 Nebenwirkungen

Gelegentlich kann es unter der Behandlung mit **Micotar® Lösung** zu Überempfindlichkeitsreaktionen wie Erythem, Brennen, Pruritus kommen. Systemische Nebenwirkungen bei lokaler Anwendung sind nicht bekannt.

#### 4.2 Gegenmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine der hier aufgeführten oder andere unerwünschte Wirkungen unter der Behandlung mit **Micotar® Lösung** bemerken.

**4.3** Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

### 5. Wie ist Micotar® Lösung aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25 °C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Die Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses beträgt 6 Wochen.

#### Stand der Information:

Juli 2006

