

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Gebrauchsinformation

Vomex A[®] Sirup

Wirkstoff: Dimenhydrinat

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
10 ml Sirup enthalten 33 mg Dimenhydrinat
Sonstige Bestandteile:
Kirscharoma, Propylenglycol, Glycerol 99%, Sacrose, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt
Eine Packung enthält 100 ml Sirup (N 1)

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Dimenhydrinat ist ein Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen aus der Gruppe der H₁-Antihistaminika.

Pharmazeutischer Unternehmer

Astellas Pharma GmbH
Postfach 80 06 28
81606 München
Tel.: (089) 45 44 01
Fax: (089) 45 44 13 29
Internet: www.astellas.com/de

Hersteller

Astellas Pharma S.p.A.
Via delle Industrie no.2
20061 Carugate (MI), Italien

Anwendungsgebiete

Zur Vorbeugung und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen unterschiedlichen Ursprungs.

Hinweis:

Dimenhydrinat ist zur alleinigen Behandlung von Übelkeit und Erbrechen im Gefolge einer medikamentösen Krebsbehandlung (Zytostatika-Therapie) nicht geeignet.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Vomex A Sirup nicht einnehmen?

- Sie dürfen Vomex A Sirup nicht einnehmen bei:
 - Überempfindlichkeit gegenüber Dimenhydrinat, anderen Antihistaminika bzw. einem anderen Bestandteil des Arzneimittels,
 - akutem Asthma-Anfall,
 - grünem Star (Engwinkelglaukom),
 - Nebennieren-Tumor (Phäochromozytom),
 - Störung der Produktion des Blutfarbstoffs (Porphyrie),
 - Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostatahyperplasie) mit Restharbildung,
 - Krampfanfällen (Epilepsie, Eklampsie).

Wann dürfen Sie Vomex A Sirup erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Vomex A Sirup nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht einnehmen dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zuträfen.

Vomex A darf nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden bei:

- eingeschränkter Leberfunktion,
- Herzrhythmusstörungen (z.B. Herzrhythmen),
- chronischen Atembeschwerden und Asthma,
- Verengung am Ausgang des Magens (Pylorusstenose).

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Vomex A Sirup sollte während der letzten Schwangerschaftswochen wegen möglicher Auslösung vorzeitiger Uteruskontraktionen nicht angewendet werden. Während der ersten sechs Monate der Schwangerschaft sollte Vomex A Sirup nur angewendet werden, wenn nicht-medikamentöse Maßnahmen keinen Erfolg gezeigt haben und der Arzt dazu rät.

Dimenhydrinat geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Bisher sind keine langfristigen, negativen Auswirkungen auf Säuglinge beschrieben. Sollte ein gestilltes Kind Anzeichen für erhöhte Unruhe zeigen, ist auf Flaschenmahlumstellung oder die Behandlung mit Vomex A Sirup abzusetzen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Schläfrigkeit, Gedächtnisstörungen und verminderte Konzentrationsfähigkeit können sich nachteilig auf die Fahrfähigkeit oder die Fähigkeit zum Arbeiten mit Maschinen auswirken. Dies gilt in besonderem Maße nach unzureichender Schlafdauer, bei Behandlungsbeginn und Präparatwechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol (s. auch "Wechselwirkungen").

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von

Vomex A Sirup, und was müssen Sie beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel einnehmen?

Bei gleichzeitiger Anwendung von Vomex A Sirup mit anderen zentral dämpfenden Arzneimitteln (Arzneimitteln, die die Psyche beeinflussen, Schlaf-, Beruhigungs-, Schmerz- und Narkosemittel) kann es zu einer gegenseitigen Verstärkung der Wirkungen kommen.

Die "anticholinerge" Wirkung von Vomex A Sirup (s. unter Nebenwirkungen) kann durch die gleichzeitige Gabe von anderen Stoffen mit anticholinergen Wirkungen (z. B. Atropin, Biperiden oder bestimmte Mittel gegen Depressionen [trizyklische Antidepressiva]) in nicht vorhersehbarer Weise verstärkt werden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Vomex A Sirup mit sogenannten Monoaminoxidase-Hemmern (Arzneimitteln, die ebenfalls zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden) kann sich u.U. eine lebensbedrohliche Darm lähmung, Harnverhalten oder eine Erhöhung des Augeninnendruckes entwickeln. Außerdem kann es zum Abfall des Blutdruckes und zu einer verstärkten Funktionseinschränkung des Zentralnervensystems und der Atmung kommen. Deshalb darf Vomex A Sirup nicht gleichzeitig mit Hemmstoffen der Monoaminoxidase angewendet werden.

Die Anwendung von Vomex A Sirup zusammen mit Arzneimitteln gegen erhöhten Blutdruck kann zu verstärkter Müdigkeit führen. Der Arzt sollte vor der Durchführung von Allergie-Tests über die Einnahme von Vomex A Sirup informiert werden, da falsch-negative Testergebnisse möglich sind.

Weiterhin ist zu beachten, daß durch Vomex A Sirup die während einer Behandlung mit bestimmten Antibiotika (Aminoglykosiden) eventuell auftretende Gehör schädigung u.U. verdeckt werden kann.

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Während der Behandlung mit Vomex A Sirup sollte kein Alkohol getrunken werden, da durch Alkohol die Wirkung von Vomex A Sirup in nicht vorhersehbarer Weise verändert und verstärkt werden kann. Auch die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, wird dadurch weiter beeinträchtigt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Vomex A Sirup nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Vomex A Sirup sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel Vomex A Sirup und wie oft sollten Sie Vomex A Sirup einnehmen?

Im allgemeinen beträgt die Dosierung für

Kinder von 6 bis 14 Jahren:

3 - 4 mal täglich 7,5 - 15 ml Sirup (entsprechend 25 - 50 mg Dimenhydrinat pro Einzeldosis), jedoch nicht mehr als 150 mg Dimenhydrinat pro Tag.

Kinder ab 6 kg:

erhalten 3 - 4 mal täglich 1,25 mg Dimenhydrinat/kg Körpergewicht. 1 ml Sirup entspricht 3,3 mg Dimenhydrinat.

Zur Orientierung dient die folgende Tabelle:

Körpergewicht des Kindes	Einzeldosis	Einnahmehäufigkeit pro Tag
6 - 10 kg	2,5 ml	3 - 4 mal
10 - 15 kg	5,0 ml	3 - 4 mal
15 - 25 kg	7,5 ml	3 - 4 mal

Wie und wann sollten Sie Vomex A Sirup einnehmen?

Zur Therapie von Übelkeit und Erbrechen werden die Gaben in regelmäßigen Abständen über den Tag verteilt.

Wie lange sollten Sie Vomex A Sirup einnehmen?

Vomex A Sirup ist, wenn vom Arzt nicht anders verordnet, nur zur kurzzeitigen Anwendung vorgesehen. Bei anhaltenden Beschwerden und spätestens nach zweiwöchiger Anwendung sollte deshalb ein Arzt aufgesucht werden, damit dieser über eine Weiterbehandlung entscheiden kann.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Vomex A Sirup in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit Vomex A Sirup ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (Vergiftungsnotruf z.B.) um Rat zu fragen.

Bei einer leichten Überdosierung kann es zu Schläfrigkeit und Schwindel sowie zu sogenannten "anticholinergen Symptomen" (Mundtrockenheit, Sehstörungen, Verstopfung) kommen. Massive Überdosierung kann zu Krämpfen, Psychosen mit Halluzinationen, Erregungszuständen, beschleunigter Herzrhythmickeit, Blutdruckanstieg, Fieber und anderen ausgeprägten anticholinergen Symptomen sowie zu Atemstörungen, Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillstand führen.

Die Beurteilung des Schweregrades der Vergiftung und die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt durch den Arzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Vomex A Sirup eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Bitte holen Sie die versäumte Dosis nicht nach, sondern setzen Sie die Einnahme von Vomex A Sirup, wie von Ihrem Arzt verordnet, fort.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bitte unterbrechen oder beenden Sie die Einnahme von Vomex A Sirup nicht, ohne mit Ihrem Arzt zuvor darüber zu sprechen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Vomex A Sirup auftreten?

In Abhängigkeit von der individuellen Empfindlichkeit und der eingenommenen Dosis kommt es häufig - insbesondere zu Beginn der Behandlung - zu folgenden Nebenwirkungen: Schläfrigkeit, Benommenheit, Schwindelgefühl und Muskelschwäche. Diese Nebenwirkungen können auch noch am folgenden Tage zu Beeinträchtigungen führen.

Gelegentlich können als sogenannte "anticholinerge" Begleiterscheinungen Mundtrockenheit, Erhöhung der Herzschlagfolge (Tachykardie), Gefühl einer verstopften Nase, Sehstörungen, Erhöhung des Augeninnendruckes und Störungen beim Wasserlassen auftreten. Auch Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Übelkeit, Schmerzen im Bereich des Magens, Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall) und Stimmungsschwankungen wurden beobachtet. Ferner besteht, insbesondere bei Kindern, die Möglichkeit des Auftretens sogenannter "paradoxe Reaktionen" wie Unruhe, Erregung, Schlaflosigkeit, Angstzustände oder Zittern. Außerdem ist über allergische Hautreaktionen und Lichtempfindlichkeit der Haut (direkte Sonneneinstrahlung meiden) und Leberfunktionsstörungen (cholestatischer Ikterus) berichtet worden.

Blutzellschäden können in Ausnahmefällen vorkommen.

Nach längerfristiger täglicher Anwendung können durch plötzliches Beenden der Behandlung vorübergehende Schlafstörungen auftreten. Deshalb sollte in diesen Fällen die Behandlung durch schrittweise Verringerung der Dosis beendet werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Über evtl. erforderliche Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkungen entscheidet Ihr Arzt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Vomex A Sirup aufzubewahren?

Vomex A Sirup nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

Bitte achten Sie auch darauf, daß das Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahrt wird.

Stand der Information:

August 2005

Kullanım talimatlarının sadecce Almanca aslının geçerli olması kaydıyla, önemli kısımlarının kısmi çevir

Vomex A[®] Şurup

Kullanım alanları (endikasyonları)

Farklı sebeplerden kaynaklanan bulantı ve kusma şikayetlerinin tedavisi ve önlenmesi için.

Uyarı:

Dimenhydrinat maddesi tek ilaç olarak, ilaç tedavisi uygulanan kanser tedavisi (sistosstatika tedavisi) sonucunda oluşan bulantı ve kusma şikayetlerinin tedavisi için uygun değildir.

Kontrendikasyonları

Vomex A Huruunu aşağıdaki durumlarda kullanmanız yasaktır:

- Dimenhydrinat maddesine, diğer antihistaminik veya bu ilacın başka bir bileşkenine karşı aşırı duyarlılık gösterdiğinizde,
- akut astim krizinde,
- Glukom (karasu),



- Ббρεкүстү беи түмүрү (Pheokromosитom),
- Hemoglobin үрөтүмү бозуктугу (Porphiri),
- Антик идат отушуму иле биликте простат бүүүмесинде (Prostata гиперплазияси),
- Kramp криздеринде (Epilepsi, Ektampi).

Ашагүдәки дүрүмдәрдә Vomex A илацинн күүләннимәә сәдәкә дөктора дәнәшүдидиктан сонра изин верилмишәр:

- Кистити карәагәер фәнксиону,
- Kalp атуш бозуклүдари (өргәгүн һизли kalp атуши),
- kronik болунум шикәyeti иле астм,
- mide чикшүндәки даралма (Pilorus stenozu).

Күүләннимдә диккат едилекек нәкталар, өнәмлер ве уяртлар
 Уякулу олма, һафиза бозуклүкләи ве консантрасйон кәбиләyetинин азалтмәси, отомобил сүрмензи veya макинеләр иле чәлишкән фааиләyetиниз олунсуз yөндә елкәileyәбәр. Бу дүрүм өзәликте yetersiz сүре уyудуғунуздә, tedaviye бәшләдигүнүздә ве илач дегүшүрдигүнүздә ве аyыра алкол куләндигүнүздә даһа еткәли оларак кәндини гөстәир ("Еткәлешимләр" бөлүмүндә бакыңыз).

Hamilelikte ве emzirme дөнәминдә nelere диккат етмелинизи?

Hamilelikte ве emzirme дөнәминдә куләнним ичүн lütfen Алманча метрин „Kontraindikasyonlar“ (Куләннимәмәси

герекен һәлләр) бөлүмүндәки билгиләи диккатә алыңыз.

Куләнним шәкли, дозу ве куләнним сүреси

Чочуклар (6 - 10 кг): Гүндә 3-4 дәфә 2.5 мл шүруп
 Чочуклар (10 - 15 кг): Гүндә 3-4 дәфә 5.0 мл шүруп
 Чочуклар (15 - 25 кг): Гүндә 3-4 дәфә 7.5 мл шүруп
 6 иле 14 яш арасындәки чочуклардә: Гүндә 3-4 дәфә 7.5 - 15 мл шүруп

Vomex A Шүрубуну ne kadar сүре алымыз?

Vomex A Шүрүбу, доктор тарафандан бәшкә шәклдә өнгөрүлмедигүндә кәса сүрәли tedavi ичүн өнгөрүлмүшдүр.

Dozajımı ве дигер куләнним һәталар

Vomex A Шүрүбу иле илгүли оларак дозасымы veya зәһирленмә мейдана гелдигүндә дерһал докторә бәшвурүлмәлидир (аcил зәһирленмә вакәси).

Yan еткилери

Күшисәл һассасиyетә ве алын доза бағли оларак tedavi бәшләгүндә сик оларак шу yan еткилер мейдана гелир: Уякулу олма, уyушуклук, буналма, бәш дөнмә һисси ве кас зәйыфлиғи.

Бу yan еткилер бир сонракы гүндә дә мейдана геләбиләр. Бәзән "антиколнери" еткилерин узантисы оларак агыз курумасы, kalp атуш ритминин yүксәлмәси (ташкәрд), гөрмә бозуклүғү, burnun икәли олма һисси, гөз чүк басыncынн yүксәлмәси ве идәр

yapma бозуклүкләри мейдана геләбиләр. Аyыра mide ве barsak шикәyetлери (өргәгүн буланлык, mide бөлгесиндәки ағрлар, kusma, kabız veya ishāl) һәләти руһиye дүзәнсизликлән дә гөзләнмәлидир. Аyыра өзәликте чочуклардә, һузурсузлук, һeyecan, уyкусузлук, korku дүрүмләрә ве йтрәмә gibi "paradoks реаксийонлар" олунмәси мүмкүндүр.

Аyыра аленк cilt реаксийонлары ве айдин ишгә карш һассаслиғи (директ гүнәш ишләрнәндән качынын!) ве карәагәер фәнксион бозуклүкләри (kolestatik иктенус) гөрүлмүшдүр.

Иstisnai дүрүмдәрдә кан һүсрәләринин зарар гөрмәси мүмкүндүр.

Уzun сүрәли гүнүлүк куләннимдәндән сонра tedavinin бирден кәсilmәси дүрүмүндә геҗици оларак уyку дүзәнсизликлери мейдана геләбиләр. Бу gibi дүрүмдәрдә, алын dozlar yavaş yavaş азалтыларак tedaviye сон верилмәлидир.

Yүсүдүнүздә, бу проспектүс ичүндә ачылканман yan еткилер тәспит еттиғүндә бу еткилери докторунуza veya eczacınıza bildiriniz.

Vomex A Шүрубунун N саклама кошуллари?

Vomex A Шүрубунун N, 25 °C үзәриндәки саклыкта сакланмәси yасактыр.

Илаци чочукларын улашамаяцаклары yerlerde сакlayınız.

Αποσπασματική μετάφραση σημαντικών οδηγιών από το μόνο ισχύον γερμανικό φύλλο οδηγιών χρήσης.

Vomex A® σιρόπι

Ενδείξεις

Για την πρόληψη και θεραπεία της ναυτίας και του έμετου που προέρχονται από διαφορετικούς παράγοντες.

Προσοχή:

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ουσίας διμενυδρανίνη ή σε άσθενες θηλάσσης και έμετου που προέρχεται από την φαρμακευτική αγωγή θεραπείας του κορινθίου (θεραπεία με κινταροστατική).

Αντενδείξεις

- Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του σιροπιού Vomex A σε περίπτωση που πάσχετε από:
 - υπερευαίσθησία στην ουσία διμενυδρανίνη ή σε άσθενες αντισηπτικών ουσιών ή σε κάποιον από τα έκδοχα του φαρμάκου αυτού
 - οξεία κρίση άσθματος
 - γλυκόζη κλειστής γνάθος
 - οξκό του επινεφριίου (φαιοχρωμοκύτταμα)
 - διαταραχή της παραγωγής της χρωστικής του αίματος (porφυρία)
 - υπερτροφία του προστάτη με κατακράτηση ούρων
 - μυϊκός σπασμός (επιληψία, εκλαμψία)

Το Vomex A πρέπει να χορηγείται μόνο μετά από σύσταση του ιατρού σας στις εξής περιπτώσεις:

- ηπτική ανεπάρκεια

- αρρυθμίες (π.χ. ταχυκαρδία)
- χρόνια δύσπνοια και βρογχικό άσθμα
- στένωση του πτεριού

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία

Σε περίπτωση χορήγησης του φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη ή την γαλουχία, σας παρακαλούμε να προσέξετε τις πληροφορίες στο κεφάλαιο Gegenanzeigen (Αντενδείξεις) του γερμανικού κειμένου.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη χορήγηση και προετοιμαστικές ενδείξεις

Υψηλά διαταραχή ή απώλεια και μειωμένη ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης μπορούν να μειώσουν την ικανότητα οδήγησης και του χειρισμού μηχανημάτων. Αυτό ισχύει κυρίως μετά από μειωμένη διάρκεια ύπνου, στην αρχή της θεραπείας, μετά από λήψη άλλων φαρμάκων καθώς επίσης και με την κατανάλωση οινόπνευματος. (Βλ.πρ. επίσης "άλληλεπιδράσεις")

Δοσολογία, τρόπος και διάρκεια χορήγησης

Παιδιά (6 - 10 кг): 3-4 φορές ημερησίως 2,5 ml σιρόπι
 Παιδιά (10 - 15 кг): 3-4 φορές ημερησίως 5,0 ml σιρόπι
 Παιδιά (15 - 25 кг): 3-4 φορές ημερησίως 7,5 ml σιρόπι
 Παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών: 3-4 φορές ημερησίως 7,5 - 15 ml σιρόπι.
 Για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λαμβάνεται το σιρόπι Vomex A Το σιρόπι Vomex A προσορίζεται για βραχυπρόθεσμη χρήση, σε περίπτωση που ο γιατρός δεν ορίζει άλλο.

Υπερδοσολογία και άλλα λάθη κατά τη χορήγηση του φαρμάκου

Σε περίπτωση υπερβολικής δόσης ή δηλητηρίασης από το σιρόπι Vomex A θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως και σιωδώςίτες έναν γιατρό (ή το κέντρο δηλητηριάσεων.)

Παρενέργειες

Ανάλογα με ευαισθησία του κάθε ατόμου και την λαμβανόμενη δόση παρουσιάζονται συχνά-κυρίως στην αρχή της θεραπείας-οι ακόλουθες

παρενέργειες: υπνηλία, βήγχος, ζάλη και αδυναμία των μυών. Οι παρενέργειες αυτές μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό και την επόμενη μέρα.

Περισσότερα μπορούν να παρουσιαστούν τα λεγόμενα «αντιχολινεργικά» συνδεδετικά συμπτώματα: έξηροστομία, ταχυκαρδία, στένωση ρινικής συμφόρησης, θόμβος οράσεως, αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, ενοχλήσεις κατά την ούρηση. Έχουν παρατηρηθεί επίσης και κοστροκεντρικές ενοχλήσεις (π.χ. ναυτία, πόνο στο στομάχι, έμετος, δυσκοιλιότητα και διάρροια) καθώς επίσης και κυκλοθυμικότητα. Είναι πιθανή και η παρουσία, κυρίως στα παιδιά, των λεγόμενων «παρόξυσμων αντιδράσεων» όπως είναι η ανυπαρξία, η ευερασιθητικότητα, τρόμος αυτιών, πονικός. Εκτός αυτών έχουν αναφερθεί αναφυλακτική αντίδραση και φωτοευαισθησία της επιδερμίδας (να αποφευχεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία) καθώς και δυσλετοουργία του ήπατος (χολεστατικός ίκτερος).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί και βλάβη στα αιματοκύτταρα. Εάν διακοπεί απότομα η θεραπεία ύστερα από μικροπρόθεσμη καθημερινή χρήση μπορεί να παρουσιαστεί παροξυσμική διαταραχή του ύπνου. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει ο/αι αυτές τις περιπτώσεις ο/αι τριμασιτρός της θεραπείας να διεξάγεται με σταδιακή μείωση της δόσης.

Εάν παρατηρήσετε άλλες παρενέργειες, οι οποίες δεν αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών, παρακαλούμε αναφερθείτε τες στο γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας.

Τρόπος φύλαξης του σιροπιού Vomex A Το σιρόπι Vomex A πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 25 °C. Φροντίστε να φυλάτε το φάρμακο μακριά απ' τα παιδιά.

Деломичан превод важних одредби једино меродавног немачког текста информације о употреби

Vomex A® сируп

Подручја примене

Као превентива и лечење мучке и повраћања разних порекла.

Напомена:

Дименхидринат није прикладан за појединачно лечење мучке и повраћања у пратњи једног медикаментозног лечења рака (терапија цитостатикима).

Контраиндикације

- Vomex A сируп не смега да узимате код:
- пресетљивости према дименхидринату и према другим антихистаминцима односно неком другом саставном делу лека.
 - акутног астматичног напада
 - зелена мрена (уско угачни глауком)
 - тумора надбубрежне жлезде (феохромоцитом)
 - сметње код производње крвне боје (порфирија),
 - повећања простате (хиперплазија простате) са стварањем мокраћног остатка
 - грчевитих напада (епилепсија, еклампсија)

Vomex A сме да се примени само након саветовања са лекаром код:

- ограничене функције јетре,
- сметњи срчаног ритмуса (нпр. пароксизична тахикардија).

- хроничних сметњи дисања и астме,
- сужења на излазу желуца (стеноза пилоруса).

На шта морате да обратите пажњу за време трудноће и за време дојења?
 У вези примене за време трудноће и за време дојења пошутете молимо податке у одсечку "Контраиндикације" немачког текста.

Мере опреза за примену и упуте упозорења

Поспаност, сметње памћења и смањена способност концентрације могу да делују негативно на способност војње или способност рада са машинама. То важи у нарочитој мери након недовољног трајања спавања, на почетку лечења и промене препарата као и код заједничког деловања са алкохолем (види и «Међусобна деловања»).

Упута о дозирању, врсти и трајању примене
 Деца (6-10 кг): 3-4 пута дневно 2,5 мл сирупа
 Деца (10-15 кг): 3-4 пута дневно 5,5 мл сирупа
 Деца (15-25 кг): 3-4 пута дневно 7,5 мл сирупа

Деца од 6 до 14 година: 3-4 пута дневно 7,5-15 мл сирупа.

Колико дуго требате да узимате Vomex A сируп? Vomex A сируп је предвиђен само за краткотрајну употребу, уколико лекар није одредио другачије.

Прекомерно дозирање и друге грешке код примене

У случају прекомерног дозирања или тровања са Vomex A сирупом мора у сваком случају одмах да се посаветује лекар (нпр.нужан позив због тровања).

Споредна деловања

У зависности о индивидуалној осетљивости и о узетој количини, долази често - нарочито на почетку лечења -

до сиедних споредних деловања: поспаности, смањености, осећаја вртоглавице и слабости мишића. Ова споредна деловања могу да воде до сметњи и следећег дана.

У неким случајевима могу да наступе такозване „антихολинергичне“ попутне појаве сушења устима, повећање редоследа рада срца (тахикардија), осећаја зачепљеног носа, сметње вида, пораст унутрашњег притиска очњу и сметњи код мокрења. Примећене су и желуцано-цревне тегобе (нпр. мучка, болови у подручју желуца, повраћање, затвор или пролив) и осцилације расположења. Надаље постоји, нарочито код деце, могућност наступа такозване "парадоксне реакције" као немпр, раздраженост, несаница, стања страха и дрхтања.

Осим тога је било извештаја о алергијној реакцији коже, осетљивости коже на светло (избегавати директно зрачење сунца) и сметњама функције јетре (холестатичан иктерус).

У изминим случајевима може да дође до оштећења крвних зрнаца.

Након дугорочне дневне примене може код наглог завршетка лечења да привремено наступе смење сна. Због тога би лечење у оваким случајевима требало да се заврши постепеним смањивањем дозе.

Ако сте споредна деловања опазили код Вас, која у овој информацији о употреби нису садржана, обавестите о томе Вашег лекара или апотекара.

Како се чува Vomex A сируп Н? Vomex A сируп Н не складиштити на више од 25° Ц. Молимо да обратите пажњу на то, да се лек чува неприступачно за децу.