



In seltenen Fällen kann Benzoylperoxid zu einer kontaktallergischen Sensibilisierung führen. Bei Überempfindlichkeit gegen Propylenglycol sind allergische Reaktionen möglich. In diesen Fällen sollte das Präparat abgesetzt und der Arzt aufgesucht werden. **Hinweis:** Zu Beginn der Behandlung kann es durch Einsetzen der Wirkung zu leichten Hautreizungen wie Rötung, Juckreiz, Spannungsgefühl und Brennen kommen. Diese Erscheinungen klingen normalerweise nach einigen Tagen ab. Austrocknen und mäßiges Schälten der Haut gehören ebenfalls zur therapeutischen Wirkung. Sollten diese Anzeichen jedoch länger als 5 Tage anhalten oder sich verstärken, ist das Präparat abzusetzen und ärztlicher Rat einzuholen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

**5. Wie ist CORDES® BPO 5% Gel aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Nach Anbruch ist das Arzneimittel 12 Monate verwendbar; jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus. Nicht über 25 °C lagern.

**6. Weitere Informationen**

**Zusammensetzung:** 1 g Gel enthält: **Wirkstoff:** Benzoylperoxid 0,05 g. **Sonstige Bestandteile:** Propylenglycol 0,1 g, Carbomer, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform und Inhalt:** CORDES® BPO 5% Gel ist in Tuben mit 30 g (N2) und 100 g (N3) erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller**  
 ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG • Sportallee 85 • 22335 Hamburg  
 Tel.: 040-50714-0 • Fax: 040-50714-110 • E-Mail: info@ichthyol.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Mai 2007 überarbeitet.

**Weitere Angaben**

Akne - Betroffen sind Jugendliche, aber auch Erwachsene  
 Die Akne tritt zumeist in der Pubertät auf. Ursache dafür ist die Umstellung des hormonellen Stoffwechsels. Sie kann aber auch in späteren Lebensphasen durch Symptome von Erkrankungen wie z. B. hormonellen Störungen, durch Einnahme von Medikamenten (z. B. Pille) ausgelöst werden. Die Akne ist eine Erkrankung des Haarbalges (Follikel). Sie tritt vor allem auf der Brust, am Rücken und im Gesicht auf. Die Akne entsteht dadurch, dass der im Haarbalg vermehrt produzierte Talg nicht abfließen kann. Ursache hierfür ist eine gestörte Hautzellbildung, die den Ausgang des Haarbalges verstopft. Durch die Ansammlung von Talg in dem Haarbalg wölbt sich die Talgdrüse und es entstehen Mitesser. In dem verstopften Haarbalg gedeihen Bakterien besonders gut. Diese sind als Aknebakterien bekannt und erzeugen Entzündungen, die sich zusätzlich als eiterhaltige Pusteln auf der Haut zeigen können. Es sollte nun schnell mit einem Arzneimittel behandelt werden, damit es nicht zu langen Krankheitsverläufen und zur späteren Ausbildung von Akne-Narben kommt. Hierfür hat die ICHTHYOL-GESELLSCHAFT mit CORDES® BPO 5% Gel ein spezielles Arzneimittel entwickelt: Der enthaltene Wirkstoff Benzoylperoxid tötet die Aknebakterien. Darüber hinaus löst er die Verstopfung am Haarbalg auf, so dass der überschüssige Talg abfließen kann. Dadurch ist die weitere Entwicklung von Aknebakterien gehemmt. Somit kommt es zu einer Abnahme der Mitesser und zur Abheilung der Pusteln.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach weiteren Präparaten der ICHTHYOL-GESELLSCHAFT oder wenden Sie sich jederzeit gerne direkt an:  
 ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG • Sportallee 85 • 22335 Hamburg  
 Tel.: 040-50714-0 • Fax: 040-50714-110  
 http://www.ichthyol.de • E-Mail: info@ichthyol.de



IHR PARTNER FÜR GESUNDE HAUT.

**Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

**CORDES® BPO 5% Gel**

**Wirkstoff: Benzoylperoxid**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss CORDES® BPO 5% Gel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich die zu Beginn der Behandlung möglicherweise auftretenden leichten Hautreizungen verschlimmern oder nach 5 Tagen nicht abklingen, sollte das Präparat abgesetzt und ärztlicher Rat eingeholt werden.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist CORDES® BPO 5% Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel beachten?
3. Wie ist CORDES® BPO 5% Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CORDES® BPO 5% Gel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. Was ist CORDES® BPO 5% Gel und wofür wird es angewendet ?**

CORDES® BPO 5% Gel ist ein Aknedermatikum (Aknemittel).

218 120 0037 020/13-07



CORDES® BPO 5% Gel wird angewendet bei allen Formen der endogen bedingten Akne (Akne vulgaris).

**2. Was müssen Sie vor der Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel beachten?**

**CORDES® BPO 5% Gel darf nicht angewendet werden**, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf den Wirkstoff Benzoylperoxid oder auf einen der sonstigen Bestandteile allergisch reagieren. **Besondere Vorsicht ist bei der Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel erforderlich:** Eine gleichzeitige Anwendung von anderen reizauslösenden äußerlich anzuwendenden Mitteln sowie eine gleichzeitige intensive UV-Bestrahlung (Sonnenbäder, Solarien) der mit Benzoylperoxid behandelten Hautflächen sollte vermieden werden. Vorsicht ist bei Patienten mit Veranlagung zu allergisch bedingten Ekzemen (Atopiker/in) bei Anwendung auf der trockenen (sebostatischen) Haut geboten. **Hinweis:** CORDES® BPO 5% Gel darf nicht auf Schleimhäute sowie im Bereich der Mund-, Nasen- und Augenwinkel aufgetragen werden. Wegen der hohen Sensibilisierungsrate soll Benzoylperoxid nicht auf vorgeschädigter (erodierter) Haut angewendet werden.

**Bei Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel mit anderen Arzneimitteln:** Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Die gleichzeitige Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel mit folgenden Mitteln sollte vermieden werden:** Eine gleichzeitige Anwendung von anderen reizauslösenden äußerlich anzuwendenden Mitteln sowie eine gleichzeitige intensive UV-Bestrahlung (Sonnenbäder, Solarien) der mit CORDES® BPO 5% Gel behandelten Hautflächen.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** CORDES® BPO 5% Gel sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Beratung mit dem Arzt angewendet werden. Im letzten Monat der Schwangerschaft sollte das Präparat nicht angewendet werden. Erkenntnisse über den Übergang in die Muttermilch nach externer Behandlung in der Schwangerschaft liegen nicht vor.

Ebenso liegen keine Erkenntnisse über die Konzentration in der Muttermilch bei externer (äußerlicher) Behandlung während der Laktation (Zeit der Milchproduktion) vor. Aus diesen Gründen ist nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch während der Laktationsphase (Stillzeit) eine strenge Abschätzung des Nutzen-/ Risikoverhältnisses durch den behandelnden Arzt und besondere Vorsicht bei der Anwendung von Benzoylperoxid geboten. Für eine Schädigung des ungeborenen Kindes ergibt sich bisher kein Anhalt.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von CORDES® BPO 5% Gel:** Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

**3. Wie ist CORDES® BPO 5% Gel anzuwenden?**

Wenden Sie CORDES® BPO 5% Gel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Soweit von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, wird CORDES® BPO 5% Gel ein- bis zweimal täglich nach vorheriger Reinigung auf die befallenen Hautpartien aufgetragen. Vor der Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel sollte die Haut gründlich gereinigt werden. Anschließend wird das Gel dünn auf die Haut aufgetragen (nicht einmassieren) und auf der Haut belassen. Nach dem Auftragen sind die Hände gründlich zu reinigen. CORDES® BPO 5% Gel sollte nicht auf die gesunde Haut aufgetragen werden. Anfangs sollte man die Häufigkeit der Anwendung je nach Hautempfindlichkeit vornehmen und gegebenenfalls die Behandlung mit einer täglich einmaligen Anwendung, jeweils abends, fortführen.

Zur Anwendung auf der Haut.

CORDES® BPO 5% Gel sollte so lange angewendet werden, bis sich die Akneerkrankung gebessert hat oder die Hauterscheinungen verschwunden sind. Bitte fragen Sie hierzu Ihren behandelnden Arzt. Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt 4 - 10 Wochen. Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach Art und Schwere des Krankheitsbildes sowie nach der Hautreaktion.

**Hinweis:** Wegen der Bleichwirkung soll CORDES® BPO 5% Gel nicht an den Augenbrauen, im Bartbereich oder der Stirnhaargrenze angewendet werden, auch darf es nicht mit farbigen Textilien in Berührung kommen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von CORDES® BPO 5% Gel zu stark oder zu schwach ist. **Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge CORDES® BPO 5% Gel angewendet haben als Sie sollten?** Falls es zu Reizungen der Haut kommt, sollte die Therapie mit niedrigeren Konzentrationen fortgesetzt oder abgebrochen werden. Spezielle Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

**Was ist zu tun, wenn Sie die Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel vergessen haben?** Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie bei der folgenden Behandlung bitte nicht die doppelte Menge CORDES® BPO 5% Gel an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

**Auswirkungen, wenn die Behandlung mit CORDES® BPO 5% Gel abgebrochen wird:** Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt die weitere Vorgehensweise, da der Behandlungserfolg gefährdet ist. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von CORDES® BPO 5% Gel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann CORDES® BPO 5% Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Patienten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>sehr häufig</b> mehr als 1 von 10 Behandelten	<b>häufig</b> weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>gelegentlich</b> weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten	<b>selten</b> weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>sehr selten</b> weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	