

GEBRAUCHSINFORMATION

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Panthenol Heumann Creme®

Wirkstoff: Dexpanthenol

Zusammensetzung

1 g Creme enthält:

als arzneilich wirksamen Bestandteil:

Dexpanthenol 50 mg;

als sonstige Bestandteile:

gereinigtes Wasser, weißes Vaseline, Wollwachs, dickflüssiges Paraffin, Wollwachsalkohole, Benzoesäure (E 210), Cetylstearylalkohole, Butylhydroxytoluol (E 321).

Darreichungsform und Packungsgrößen

Panthenol Heumann Creme® ist in Originalpackungen mit 20 g (N1), 50 g (N1) und 100 g (N2) Creme erhältlich.

Stoff- oder Indikationsgruppe/Wirkungsweise

Panthenol Heumann Creme® enthält mit Dexpanthenol einen Wirkstoff aus der Gruppe der wasserlöslichen Vitamine.

Panthenol Heumann Creme® unterstützt die Wundheilung.

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer HEUMANN PHARMA

GmbH & Co. Generica KG
Südwestpark 50 · 90449 Nürnberg
Telefon/Telefax: 0700 4386 2667
Internet: www.heumann.de

Anwendungsgebiete

Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Hautschädigungen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Panthenol Heumann Creme® nicht anwenden?

Panthenol Heumann Creme® darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber Dexpanthenol, Benzoaten oder einem der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit besteht für Panthenol Heumann Creme® keine Anwendungsbeschränkung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Benzoesäure kann leichte Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten auslösen.

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Wollwachs und Cetylstearylalkohol können örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bei gleichzeitiger Anwendung von Panthenol Heumann Creme® im Genital- oder Analbereich und Kondomen kann es auf Grund des enthaltenen Vaselins zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Panthenol Heumann Creme® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Panthenol Heumann Creme® sonst nicht richtig wirken kann!

Anwendungshinweis:

Tube öffnen und mit dem Dorn des Schraubverschlusses die Metallmembran durchstoßen.

Wie viel von Panthenol Heumann Creme® und wie oft sollten Sie Panthenol Heumann Creme® anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, Panthenol Heu-

mann Creme® ein- bis mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen.

Wie lange sollten Sie Panthenol Heumann Creme® anwenden?

Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich und richtet sich danach, wie schnell Ihre Beschwerden abklingen. Sollten sich diese nicht bessern oder sogar verschlimmern, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Panthenol Heumann Creme® auftreten?

In seltenen Fällen sind Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. allergische Hautreaktionen) beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollte die oben genannte Nebenwirkung bei Ihnen zum ersten Mal auftreten oder Ihre Beschwerden sich verschlimmern, soll Panthenol Heumann Creme® nicht nochmals angewendet werden. Benachrichtigen Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Faltschachtel und Tube aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Hinweis auf die Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Öffnen der Tube ist Panthenol Heumann Creme®, nicht über 25 °C aufbewahrt, maximal 6 Monate haltbar.

Wie ist Panthenol Heumann Creme® aufzubewahren?

Panthenol Heumann Creme® sollte nicht über 25 °C aufbewahrt werden.

Stand der Information:

November 2003


HEUMANN

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Liebe Patientin,
lieber Patient,

Sie haben Panthenol Heumann Creme®, ein Arzneimittel mit dem bewährten Wirkstoff Dexpanthenol, erhalten.

Dieses Arzneimittel soll Ihnen helfen, schneller beschwerdefrei zu werden. Damit Panthenol Heumann Creme® ihre Wirkung optimal entfalten kann, ist es wichtig, dass Sie sich an die Dosierungsanleitung in der Gebrauchsinformation oder die Angaben Ihres Arztes halten.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Wichtige Information zur Entsorgung dieses Arzneimittels und seiner Verpackung

Die Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG hat sich dem Rücknahme- und Verwertungssystem Vfw-REMEDICA angeschlossen. Wir bitten Sie deshalb, dieses Arzneimittel nicht dem Restmüll beizufügen, sondern es zusammen mit seiner Verpackung bei an Vfw-REMEDICA teilnehmenden Apotheken abzugeben.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6816078.00.00

0-04068-06 - 4719621/5677/02.06-034/02/02