



7870620153/D2345

Wichtige Gebrauchsinformation. Vor Anwendung aufmerksam lesen!

# Kohle-Hevert®

Bei Durchfall und Nahrungsmittelvergiftung

**Kohle-Hevert**

Tabletten

Wirkstoff: Medizinische Kohle 250 mg

Bei Durchfall und Nahrungsmittelvergiftung

**Anwendungsgebiete**

Bei Durchfall sowie bei Vergiftungen durch Nahrungsmittel, Schwermetalle und Arzneimittel. Kohle-Hevert Tabletten sind nicht anzuwenden bei Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel.

**Gegenanzeigen**

Wann dürfen Kohle-Hevert Tabletten nicht eingenommen werden?

Bei fieberhafter Diarrhoe (Durchfall).

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Informieren Sie bei Verdacht auf Vergiftungen unverzüglich einen Arzt oder den Rettungsdienst! Bei verschiedenen Giften und Arzneimitteln sind andere oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Medizinische Kohle ist nicht wirksam bei Vergiftungen mit organischen und anorganischen Salzen sowie Lösungsmitteln, z. B. Lithium, Thallium, Cyanid (Blausäure), Eisensalzen, Methanol, Ethanol und Ethylenglykol (z. B. in Frostschutzmitteln). Hier sind andere Maßnahmen zur Giftelimination (z. B. Magenspülung) angezeigt. Wichtige Gifte, bei denen medizinische Kohle wirkungslos ist und eine geeignete orale Therapie bekannt ist, sind nachfolgend aufgeführt:

	Spezifisches Gegengift (Antidot)
Cyanid	4-Dimethylaminophenol
Eisenverbindungen	Deferoxamin (Desferrioxamin)
Lithium	Calciumpolystyrolsulfonat
Methanol	Ethanol
Ethylenglykol	Ethanol

Bei vielen Vergiftungen ist zusätzlich zu medizinischer Kohle auch ein spezifisches Gegengift zu verabreichen (z. B. Acetylcystein bei Paracetamolvergiftung).

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Bezüglich der Anwendung von Kohle-Hevert Tabletten in Schwangerschaft und Stillzeit bestehen keine Einschränkungen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Kohle-Hevert Tabletten?

Kohle-Hevert Tabletten sollen nicht unmittelbar mit anderen Arzneimitteln eingenommen werden, da deren Wirksamkeit vermindert werden kann.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Wie viele Kohle-Hevert Tabletten und wie oft sollten Kohle-Hevert Tabletten eingenommen werden?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene bei Durchfall 3- bis 4-mal täglich 2 bis 4 Tabletten in viel Flüssigkeit zerfallen ein, Kinder die Hälfte. Bei Vergiftungen kann die Dosis ohne Bedenken bis auf 50 Tabletten, die in Flüssigkeit zu einem Brei verrührt sind, erhöht werden. In diesem Fall ist zuzüglich die Einnahme eines salinischen Abführmittels wie Natriumsulfat 30 bis 60 Minuten später zu empfehlen.

Wie lange sollten Kohle-Hevert Tabletten eingenommen werden?

Bei Durchfall bis zur Normalisierung des Stuhlgangs. Sollte die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.





### Nebenwirkungen

363/0612

*Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Kohle-Hevert Tabletten auftreten?*

Bei der Einnahme von Kohle-Hevert Tabletten gegen Durchfall sind in den empfohlenen Dosierungen keine Nebenwirkungen bekannt. Nach sehr hohen Dosen, wie sie bei Vergiftungen eingenommen werden, kann es in Einzelfällen zu Verstopfung und zum Darmverschluss (mechanischer Ileus) kommen, dem durch Gabe salinischer Abführmittel (z. B. Natriumsulfat) vorgebeugt werden kann. Da medizinische Kohle unverändert wieder ausgeschieden wird, kommt es nach der Einnahme von Kohle-Hevert Tabletten zu einer Schwarzfärbung des Stuhls. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und Umkarton angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

*Wie sind Kohle-Hevert Tabletten aufzubewahren?*

Nicht über 25°C lagern! Vor Feuchtigkeit schützen!

Arzneimittel: Stets vor Kindern geschützt aufbewahren!

### Zusammensetzung

1 Tablette enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Medizinische Kohle 250 mg

Sonstige Bestandteile: Bentonit, Maisstärke (0,006 BE pro Tablette)

### Darreichungsform und Packungsgrößen

20 / 50 / 100 / 300 Tabletten zum Einnehmen.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, In der Weiherwiese 1, D-55569 Nussbaum

### Stand der Information

September 2006

Zul.-Nr. 3199.99.99

## Liebe Patientin, lieber Patient!

Wir wollen Ihnen einige Informationen zu diesem Präparat und Ihrer Erkrankung geben.

Medizinische Kohle verbleibt im Magen-Darm-Trakt und wird nicht resorbiert, also nicht in die Blutbahn aufgenommen. Kohle wird im Darmsaft in kleinste Teilchen aufgeschwemmt. Um die Kohle im Darm in feinste Teilchen zu verteilen, muss viel Flüssigkeit mit der Kohle zugeführt werden, wodurch ebenfalls der Flüssigkeitsverlust bei Durchfallerkrankungen ausgeglichen werden kann. Kohle hat eine sehr große Oberfläche. Durch diese werden Giftstoffe (Toxine), die durch Bakterien erzeugt werden, und organische Substanzen wie Bakterien selbst, durch Anlagerung (Adsorption) ausscheidungsfähig gemacht.

Auch bei Vergiftungen werden toxische Stoffe im Darm durch eine größere Menge Kohle adsorbiert (z. B. bis zu 50 Kohle-Hevert Tabletten in reichlich Wasser gelöst einnehmen). Die Kohle ist umso wirksamer je schneller die Einnahme nach der Aufnahme des Giftes erfolgt, sodass die toxischen Stoffe durch den Magen-Darm-Trakt schnell ausgeschieden werden und nicht in die Blutbahn eindringen können.

Die gleichzeitige Einnahme eines salinischen Abführmittels wie Natriumsulfat verstärkt die o. a. Kohleentgiftungsfunktion.

Hinweis: Da die Kohle mit dem Darminhalt wieder ausgeschieden wird, färbt sich der Stuhl dunkel bis schwarz. Sehr wichtig ist es, bei allen Durchfallerkrankungen den Wasser- und Salzverlust zu ersetzen. Da Kohle auch stopfend wirken kann, ist es für die Wirkung wichtig, möglichst viel zu trinken, z. B. den Inhalt von mindestens 2 Flaschen Wasser. Auch Cola-Limonaden können getrunken werden. Zum Ausgleich des Salzverlustes ist es empfehlenswert, einem Liter Wasser oder Limonade 1 Teelöffel Salz hinzuzufügen oder Salzgebäck zu verzehren.

Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung! Ihr Hevert-Team

# HEVERT



**ARZNEIMITTEL**  
GmbH & Co. KG  
In der Weiherwiese 1  
D-55569 Nussbaum  
Tel. (06751) 9100  
E-Mail [info@hevert.de](mailto:info@hevert.de)  
[www.hevert.de](http://www.hevert.de)

7870620153

