

# Dermapharm AG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

**Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!**

## Micotar® Creme

**Wirkstoff: Miconazolnitrat**

### Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:  
1 g Creme enthält 20 mg Miconazolnitrat

Sonstige Bestandteile:

Benzoessäure, Macrogolstearat 1500, Macrogolglycerololeate (Ph.Eur.), dickflüssiges Paraffin, gereinigtes Wasser

### Darreichungsform und Inhalt:

OP zu 20 g und 50 g Creme

**Antimykotikum (pilztötendes Mittel gegen Pilzbefall)**

### Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG  
Luise-Ullrich-Straße 6  
82031 Grünwald  
Tel.: 0 89/6 41 86-0  
Fax: 0 89/6 41 86-130

### Hersteller:

**mibe** GmbH Arzneimittel  
Münchener Straße 15  
06796 Brehna  
(Ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

### Anwendungsgebiete:

- Interdigitalmykosen
- Mykosen der Haut und Hautfalten
- oberflächliche Kandidosen

### Gegenanzeigen:

**Wann dürfen Sie Micotar® Creme nicht anwenden?**

**Micotar® Creme** darf nicht angewendet werden bei:

- bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Miconazolnitrat und Benzoessäure
- bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile.

### Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da der Wirkstoff bei lokaler Anwendung praktisch nicht resorbiert wird, kann **Micotar® Creme** während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit **Micotar® Creme** zu vermeiden, sollten stillende Frauen die Creme während der gesamten Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

**Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Benzoessäure kann leichte Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten auslösen.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

##### **Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Micotar® Creme?**

Bei der Anwendung auf der Haut sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Da der Wirkstoff praktisch nicht in den Blutkreislauf gelangt, sind Wechselwirkungen auch nicht zu erwarten.

##### **Hinweis:**

Bei einer Behandlung im Genital- oder Analsbereich kann es wegen der enthaltenen Hilfsstoffe (Stearate und Paraffin) bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

#### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Micotar® Creme** nicht anders verordnet hat.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Micotar® Creme** sonst nicht richtig wirken kann.

##### **Wieviel von Micotar® Creme und wie oft sollten Sie Micotar® Creme anwenden?**

1–3mal täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen.

##### **Wie und wann sollten Sie Micotar® Creme anwenden?**

Die Creme wird morgens und abends aufgetragen und leicht mit dem Finger einmassiert.

##### **Wie lange sollten Sie Micotar® Creme anwenden?**

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem klinischen Bild.

Die Behandlung sollte bis zum Verschwinden der positiven Pilzkulturen durchgeführt werden, mindestens jedoch noch 14 Tage nach Abklingen der Beschwerden. Zwischen dem letzten Auftragen und dem Anlegen einer Pilzkultur sollte ein therapiefreies Intervall von 3–4 Tagen liegen, damit evtl. Wirkstoffreste die Kultur nicht stören.

#### **Überdosierung und andere Anwendungsfehler:**

##### **Was ist zu beachten, wenn Sie zu viel oder zu wenig Micotar® Creme angewendet haben?**

Holen Sie eine vergessene Behandlung nach und führen Sie die Therapie in gewohnter Weise weiter.

Wenn Sie zu viel Creme aufgetragen haben, sind keine Folgen zu erwarten. Sollten Sie jedoch ungewöhnliche Symptome feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt in Verbindung.

##### **Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?**

Die Behandlung sollte bis zum Ende durchgeführt werden, auch wenn die Symptome schon beseitigt sind. Die Infektion kann immer noch bestehen und möglicherweise wieder ausbrechen, wenn das Mittel zu früh abgesetzt wird.

#### **Nebenwirkungen:**

##### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Micotar® Creme auftreten?**

Selten kann es unter Anwendung des Präparates zu Reizungen mit Rötung, Stechen und/oder Brennen kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin mit.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Tube und der Fallschachtel aufgedruckt.

Bitte verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen beträgt 12 Wochen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

#### **Stand der Information:**

Juni 2005



Recycling-Papier aus Altpapier. Spart Energie und Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

G100323  
Code 385

09/07